

Poučení k očkovaní:

Níže přilože informace výrobce vakcíny ohledně vedlejších účinků.

Prostudujte.

Dále tam jsou prohlášení, která je potřeba k očkovaní přinést kompletně vyplněná a podepsaná (muži nemusí to o těhotenství :-)).

Pokud očkovaní nechcete, napište prohlášení, že očkovaní nechcete a předejte do ordinace.

Očkujeme každý den kromě úterý kolem 9 ráno. Počítat s čekáním minimálně 30 min.

**!!!!POZOR!!!!**

Bez vyplněných prohlášení nebudete očkovaní - vyplňování v ordinaci z časových a kapacitních důvodů není možné.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tato očkovací látka nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku M–M–RVAXPRO byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

**Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 očkovaných)**

- Horečka (38,5 °C nebo vyšší).
- Zarudnutí v místě aplikace injekce; bolest v místě aplikace injekce; otok v místě aplikace injekce.

**Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 očkovaných)**

- Vyrážka (včetně vyrážky podobné spalničkám).
- Modřina v místě aplikace injekce.

**Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 očkovaných)**

- Ucpaný nos a bolest v krku; infekce horních dýchacích cest nebo virová infekce; výtok z nosu.
- Pláč.
- Průjem; zvracení.
- Kopřivka.
- Vyrážka v místě aplikace injekce.

**Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)\***

- Aseptická meningitida (horečka, pocit nevolnosti, zvracení, bolest hlavy, ztuhlá šíje a citlivost na světlo); otok varlat; infekce středního ucha; zánět slinných žláz; atypické spalničky (popsané u pacientů, kteří dostali očkovací látku vyrobenou z usmrčených virů, obvykle se podávala před rokem 1975).
- Zduřelé uzliny.
- Snazší tvorba modřin nebo krvácení, než je obvyklé.
- Těžká alergická reakce, která může zahrnovat potíže s dýcháním, otok obličeje, místní otoky a otok končetin.
- Podrážděnost.
- Záchvaty křečí bez horečky; záchvaty křečí s horečkou u dětí; nejistá chůze; závrať; onemocnění zahrnující zánět nervového systému (mozku a/nebo míchy).
- Onemocnění sestávající ze svalové slabosti, abnormálních pocitů brnění v ruce, nohou a horní části těla (Guillain-Barrého syndrom).
- Bolest hlavy; mdloby; nervové poruchy, které mohou způsobit slabost, brnění nebo necitlivost; poruchy očního nervu.
- Výtok z očí a svědění očí s povlakem na víčkách (konjunktivitida).
- Zánět oční sítnice se změnami vidění.
- Hluchota.
- Kašel; infekce plic s horečkou nebo bez ní.
- Pocit nevolnosti (nauzea).
- Svědění; zánět podkožní tukové tkáně; červené nebo rudé, ploché tečkovité skvrny pod kůží; zatvrdlá, zvýšená místa na kůži; závažná nemoc s vředy nebo puchýři na kůži, v ústech, očích a/nebo pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův syndrom).
- Bolest a/nebo otok kloubů (obvykle přechodného rázu a jen vzácně chronické); bolest svalů.
- Krátkodobé pálení a/nebo píchání v místě aplikace injekce; puchýře a/nebo kopřivka v místě aplikace injekce.
- Celkový pocit nepohody; otok; bolestivost.
- Zánět cév.

\*Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny při podávání přípravku M–M–RVAXPRO nebo u očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám vyráběné firmou Merck & Co., Inc. nebo u jejích monovalentních (jednotlivých) složek, a to během podávání po uvedení na trh a/nebo při klinických studiích.

ZZMV, MUDr. Petr Štefek, adresa ordinace: Saskova 1481, Kladno

## Poučení o aplikaci očkovací látky: M-M-RVaxPro

Jméno..... RČ.....

Prohlašuji, že momentálně netrpím žádným akutním onemocněním. Nebyl(a) jsem v posledních 2-4 týdnech očkovan(a) jinou vakcínou. V minulosti jsem měl(a) po aplikaci jakékoli očkovací látky tyto nežádoucí reakce:

Byl(a) jsem poučen(a) o povaze možných místních i celkových nežádoucích účinků očkovací látky a byla mi dána možnost položit doplňující otázky. Dále jsem poučen(a) o režimu po očkování- **nutnosti setrvání minimálně 30 minut po očkování v čekárně z důvodu vážné reakce**, dále pak vyhnout se během následujících 3 dnů fyzické námaze a nezatěžovat očkovanou horní končetinu. Neabsolvovat jiné očkování v následujících 4 týdnech.

Datum a čas ..... Podpis pacienta .....

ZZMV, MUDr. Petr Štefek, adresa ordinace: Saskova 1481, Kladno

## Poučení o aplikaci očkovací látky: M-M-RVaxPro

Jméno..... RČ.....

Prohlašuji, že momentálně netrpím žádným akutním onemocněním. Nebyl(a) jsem v posledních 2-4 týdnech očkovan(a) jinou vakcínou. V minulosti jsem měl(a) po aplikaci jakékoli očkovací látky tyto nežádoucí reakce:

Byl(a) jsem poučen(a) o povaze možných místních i celkových nežádoucích účinků očkovací látky a byla mi dána možnost položit doplňující otázky. Dále jsem poučen(a) o režimu po očkování- **nutnosti setrvání minimálně 30 minut po očkování v čekárně z důvodu vážné reakce**, dále pak vyhnout se během následujících 3 dnů fyzické námaze a nezatěžovat očkovanou horní končetinu. Neabsolvovat jiné očkování v následujících 4 týdnech.

Datum a čas ..... Podpis pacienta .....

**ZZMV, MUDr. Petr Štefek, adresa ordinace: Saskova 1481, Kladno**

**Poučení o aplikaci očkovací látky: M-M-RVaxPro**

Jméno.....

RČ.....

Prohlašuji, že nejsem těhotná a plně beru na vědomí níže uvedenou informaci výrobce vakcíny.

Přípravek M-M-RVAXPRO se nesmí aplikovat těhotným ženám. Ženy v plodném věku musí podniknout nezbytná opatření k tomu, aby po očkování neotěhotněly podobu 1měsíce.

Datum a čas ..... Podpis pacienta .....

**ZZMV, MUDr. Petr Štefek, adresa ordinace: Saskova 1481, Kladno**

**Poučení o aplikaci očkovací látky: M-M-RVaxPro**

Jméno.....

RČ.....

Prohlašuji, že nejsem těhotná a plně beru na vědomí níže uvedenou informaci výrobce vakcíny.

Přípravek M-M-RVAXPRO se nesmí aplikovat těhotným ženám. Ženy v plodném věku musí podniknout nezbytná opatření k tomu, aby po očkování neotěhotněly podobu 1měsíce.

Datum a čas ..... Podpis pacienta .....